НИИ гриппа
им. А.А. Смородинцева

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПНЕВМОВИРУСНЫМ (РСВ и МПВ) ИНФЕКЦИЯМ

за 42 неделю 2026 года. (12.10.26 - 18.10.26)

На 42 неделе 2026 года по данным еженедельного ПЦР-мониторинга из 32 городов (Астрахань, Белгород, Биробиджан, Волгоград, Вологда, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Норильск, Омск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск, Самара, Симферополь, Смоленск, Санкт-Петербург НИИ Гриппа, Сыктывкар, Тула, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск), расположенных в 7 Федеральных округах, ситуация по **респираторно-синцитиальному вирусу (РСВ) и метапневмовирусу (МПВ)** в России оставалась благополучной.

Рис.1. Мониторинг респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) и метапневмовирусной (МПВ) инфекции у больных ОРВИ в городах России



В целом, по данным еженедельного ПЦР-мониторинга за период с 40 недели 2026 года по 42 неделю 2026 года РСВ был выявлен во все недели. В среднем частота диагностирования РС-вируса составила **0,1%**. Максимальная частота детекции РС-вирусной инфекции была зарегистрирована на 40 и 42 неделе 2026 года, составив **0,1%** от числа обследованных больных.

С 40 недели 2026 года по 42 неделю 2026 года МПВ был выявлен во все недели. В среднем частота диагностирования МПВ составила **0,08%**. Максимальная частота детекции МПВ инфекции была зарегистрирована на 41 неделе 2026 года, составив **0,09%** от числа обследованных больных.

Рис.2. Мониторинг респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) инфекции у больных ОРВИ отдельных возрастных групп в городах России



Мониторинг результатов ПЦР-диагностики РСВ инфекции в отдельных возрастных группах больных показал, что на 42 неделе 2026 года на РСВ обследован 6801 больной. Из них в возрастной группе 0-2 лет - 1170, 3-6 лет - 981, 7-14 лет - 1217, 15 лет и старше - 3433. Выявлено 7 (**0,1%**) случаев **РСВ** инфекции, в том числе 2 (0,2%) случая у детей в возрасте 0-2 года, 1 (0,1%) случай у дошкольника в возрасте 3-6 лет, 2 (0,2%) случая у школьников в возрасте 7-14 лет и 2 (0,06%) случая у больных возрастной группы 15 лет и старше.

Рис.3. Мониторинг метапневмовирусной (МПВ) инфекции у больных ОРВИ отдельных возрастных групп в городах России



Мониторинг результатов ПЦР-диагностики МПВ инфекции в отдельных возрастных группах больных показал, что на 42 неделе 2026 года на МПВ обследован 6801 больной. Из них в возрастной группе 0-2 лет - 1170, 3-6 лет - 981, 7-14 лет - 1217, 15 лет и старше - 3433. Выявлено 5 (**0,07%**) случаев **МПВ** инфекции, в том числе 1 (0,09%) случай у ребёнка в возрасте 0-2 года, 1 (0,1%) случай у дошкольника в возрасте 3-6 лет и 3 (0,09%) случая у больных возрастной группы 15 лет и старше.

Рис. 4. Суммарная частота диагностирования респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) и метапневмовирусной (МПВ) инфекции в отдельных возрастных группах больных за период с 40 недели 2026 года по 42 неделю 2026 года



В целом, с 40 по 42 неделю 2026 года на РСВ и МПВ обследовано 18727 больных в том числе 3043 детей в возрасте 0-2 года, 2616 дошкольников 3-6 лет, 2949 школьников 7-14 лет и 10119 взрослых больных в возрасте 15 лет и старше.

РСВ, как причину ОРВИ, чаще регистрировали в возрастной группе 0-2 года. Суммарная частота диагностирования у детей в возрасте 0-2 года составила **0,2%** от числа обследованных больных возрастной группы. У детей в возрасте 3-6 лет РСВ был выявлен в **0,08%** случаев, у школьников 7-14 лет – в **0,07%**. У взрослых больных возрастной группы 15 лет и старше РСВ был диагностирован у **0,09%** больных.

МПВ, как причину ОРВИ, чаще регистрировали в возрастной группе 0-2 года и 7-14 лет. Суммарная частота диагностирования у детей в возрасте 0-2 года составила **0,1%** от числа обследованных больных возрастной группы. У детей в возрасте 3-6 лет РСВ был выявлен в **0,08%** случаев, у школьников 7-14 лет – в **0,1%**. У взрослых больных возрастной группы 15 лет и старше РСВ был диагностирован у **0,05%** больных.